VITARAX

Produit strictement professionnel.
N° AMM : FR-2013-0067
Conditionnement : 5kg

Produit rodonticide anticoagulant à base de difénacoum.

1. COMPOSITION :

0,005% de difénacoum (antidote : vitamine k1). Appâts de couleur bleue sous forme de pâte huilée ultra appétente emballée individuellement.

2. MODE D'ACTION :

Le difénacoum est un anticoagulant. Les rongeurs meurent d'hémorragies internes. L'effet retard de cette molécule permet de contourner la méfiance des rongeurs. La présentation « pâte » permet de lutter contre les nuisibles les plus délicats. Attention à son utilisation en présence d'animaux domestiques.

3. MODE D'EMPLOI :

Porter des gants appropriés, ne pas ouvrir les sachets. Déposer dans des postes d'appâtage : 3 sachets pour des souris, 18 pour des rats. Espacer les postes de 1 à 2 mètres pour des souris, de 5 à 10 mètres pour des rats. Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés. Inspecter et réapprovisionner les postes quelques jours après la première application puis une fois par semaine. Tant que l'appât est consommé, ne pas nettoyer les postes entre deux applications. Ramasser les sachets restants, les détruire conformément à la règlementation en vigueur. Ramasser les cadavres, les enterrer ou les envoyer à l'équarrissage (à partir de 40kg). Les symptômes apparaissent 36 h après l'ingestion et les rongeurs meurent en 4 à 10 jours. Retirer tous les postes après la fin du traitement.
Adapter la dose ou le nombre de sachets préconisés par boîte d'appâts à la dose recommandée et respecter les intervalles d'application du produit. Le nombre de boîtes d'appâts est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.
Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition de phénomènes de résistance. Adopter des méthodes de gestion intégrée telles que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène. Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution d'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance. Ne pas utiliser le produit dans des zones où les cas de résistance sont suspectés ou établis. Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de résistance.

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés. Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles. S'assurer que les boîtes sont correctement fermées pour éviter que les appâts ne soient sortis des postes par les rongeurs.
Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Déposer les postes usagés et les appâts non consommés ou non utilisés dans une déchetterie ou dans tout autre centre de collecte approprié. L'emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Les boîtes à appât ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que les rodonticides. Retirer toutes les boîtes à appât après la fin du traitement. Veillez à porter des gants lors de l'installation de l'appât autant pour protéger votre peau du contact du produit et pour ne pas laisser votre odeur sur les appâts déposés.
Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer. Toujours bien refermer le seau et ne pas laisser à portée des enfants. En cas d'intoxication accidentelle, consulter immédiatement un médecin en notifiant la matière active et l'antidote précisé. (VITAMINE K1)